

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto _____

Cellulare n. _____

genitore del minore _____ nato il _____

dichiaro

- di essere stato informato che Regione Lombardia in collaborazione con ATS Bergamo quest'anno ha promosso attivamente una campagna vaccinale atta a somministrare a tutti i bambini il vaccino antinfluenzale spray nasale (denominato FLUENZ tetra) o, in caso di controindicazioni al vaccino spray, il vaccino iniettabile (VAXIGRIP o analoghi);
- che oggi il bambino/a sta bene e, quindi, accetto di far eseguire la vaccinazione al nostro Pediatra di Famiglia, che ci ha informato su vantaggi, effetti collaterali e controindicazioni;
- di essere stato invitato a trattenere il minore nei pressi dell'ambulatorio (anche al suo esterno) per i 15-20 minuti successivi alla somministrazione del vaccino, per eventuali interventi medici d'urgenza in presenza di reazioni avverse da vaccino.

data _____

firma _____

Vaccino anti influenzale

L'unica misura preventiva specifica efficace contro l'influenza stagionale è la vaccinazione.

E' possibile vaccinare i bambini che non abbiano controindicazioni al vaccino a partire dai 6 mesi di età: la protezione indotta dal vaccino ha inizio due settimane dopo la somministrazione e permane per 6/8 mesi, poi decresce.

FLUENZ TETRA spray nasale

Il vaccino in spray nasale (nome commerciale: FLUENZ TETRA), scelto e messo a disposizione a titolo gratuito da Regione Lombardia per i bambini di età uguale o superiore ai 2 anni .

Controindicazioni

Questo vaccino in spray nasale non può essere somministrato in alcuni casi:

1. Nei bimbi **immunodepressi** o che convivono con persone immunodepresse (ad esempio: affette da gravi deficit immunitari, o sottoposte a terapie antitumorali oa terapie a base di cortisone per bocca protratte e ad alte dosi). Se la persona immunodepressa non è convivente, evitate comunque che venga a contatto col bambino nelle due settimane successive alla vaccinazione con Fluenz tetra

2. Se il bambino soffre di **asma grave** (necessitante ricoveri)

3. Se il bambino ha avuto una **reazione anafilattica all'uovo**

4. Se il bambino è allergico alla gelatina o alla gentamicina

5. Se il bambino assume salicilati: l'acido salicilico e i suoi sali (di sodio, potassio e colina); gli esteri dell'acido salicilico: salicilato di metile, di fenile e il salsalato; la salicilammide; l'acido acetilsalicilico; diflunisal, olsalazina, sulfasalazina

6. se il bambino ha meno di 24 mesi compiuti

Se il bambino è affetto da una **patologia cronica importante** (cardiopatie, malattie metaboliche, gravi malattie neurologiche, sindromi da malassorbimento, diabete..) valutate assieme al vostro Pediatra quale sia il vaccino migliore

Il vaccino nasale deve essere invece rimandato se il bambino

- Ha febbre
- Ha un broncospasmo in corso o lo ha avuto nelle 72 ore precedenti
- Ha effettuato da meno di un mese o ha programmato fra meno di un mese il vaccino MPR-V (antimorbillo-parotite-rosolia o antimorbillo-parotite-rosolia-varicella), perché il vaccino per la rosolia potrebbe essere meno protettivo e viceversa

Effetti collaterali

È un vaccino di solito ben tollerato, tra gli effetti collaterali eventuali sono descritti febbre, malessere, scolo nasale lieve, mal di testa, inappetenza, effetti che si risolvono spontaneamente entro 48 ore dalla somministrazione. Estremamente rare le reazioni allergiche gravi; è tuttavia necessario che il paziente rimanga nei pressi della sede vaccinale per 15-20 minuti dopo la vaccinazione, a titolo precauzionale.

Vaxigrip Tetra iniettivo

I pazienti fra i 6 mesi e i 2 anni e i bimbi con controindicazioni alla vaccinazione con spray nasale potranno essere vaccinati con VAXIGRIP TETRA, un vaccino inattivato somministrato per via intramuscolare.

Questo vaccino protegge da 4 ceppi del virus antinfluenzale a partire da 2-3 settimane dopo la somministrazione. I bambini fino a 9 anni di età che si vaccinano per la prima volta contro l'influenza dovranno eseguire una seconda dose dello stesso vaccino a distanza di un mese dalla prima.

Controindicazioni

- 1- Pregresse reazioni allergiche allo stesso vaccino o a sue componenti
- 2- Età inferiore ai 6 mesi

Vaccinazione preferibilmente in ambiente protetto

- 1- Allergia all'ovoalbumina

Il vaccino nasale deve essere invece rimandato se il bambino

- Ha febbre

Questo vaccino può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini (iniezione in arti differenti)

Effetti collaterali

È un vaccino di solito ben tollerato, tra gli effetti collaterali eventuali sono descritti sintomi locali in sede di somministrazione, mialgie, cefalea, febbre, malessere, vomito. Estremamente rare le reazioni allergiche gravi; è tuttavia necessario che il paziente rimanga nei pressi della sede vaccinale per 15-20 minuti dopo la vaccinazione, a titolo precauzionale.